

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 - Stagnacja	MSA - miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 - Rezygnacja	
S001	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	6	6	49; 37	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie u podstawy; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - podstawy i na konarze; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,54;
S002	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4,5	49;35	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - wypróchnienie; OP - mało; I - 20% na S;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 0; OS - średnia; MSA - 2,50;
S003	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	22	14	250	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 30% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,14;
S004	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	24,5	16	279	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 20% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,90;
S005	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	7,5	68	UK – nieregularna; KN -x; P - 15% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne; C - złe; D - szczelina zablizniona; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,23;
S006	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	23,5	10	160	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 80% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,02;
S007	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	7,5	45	UK – nieregularna; KN -x; P - 15% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne; C - złe; D - szczelina zablizniona; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,03;
S008	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	25,5	11,5	171	UK – nieregularna; KN - x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,02;
S009	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	19	9	128	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 40% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,69;
S010	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	27,5	22	277	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - prchnięjący po konarze; OP - średnio; I - 100% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,03;
S011	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	9	5	59	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 15% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,69;
S012	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	27	15	212	UK – nieregularna, szeroka; KN -x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 30% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,69;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S013	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	28	16	142; 146; 181;	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie u podstawy; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 50% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,97;
S014	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	15	17,5	144; 94; 92	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie na 1,2 m; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 50% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,69;
S015	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	17	14,5	134; 173	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie na 1,2 m; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 50% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,29;
S016	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	16	17	42; 84; 180; 115; 132; 102	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie u podstawy; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 1,84;
S017	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	10	14	185	UK – nieregularna; KN - rozwidlony na 1,4 m; P - 10% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 25% na E;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 1; OS - średnia; MSA - 2,69;
S018	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	9	7	75	UK – nieregularna; KN - x; P - 5% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach, u podstawy 20 cm; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 20% na E;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 1; OS - średnia; MSA - 2,82;
S019	Jabłoń	<i>Malus sp.</i>	8	7	67	UK – nieregularna, zagłuszona; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,20;
S020	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	11	94; 89	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 1,4 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - średnia; MSA - 3,01;
S021	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13,5	9	119	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 25% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x; mało;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,23;
S022	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16,5	14	116	UK – nieregularna, szeroka; KN - x; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – mało, boa, przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,72;
S023	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	8	115	UK – nieregularna, kier od SW; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na NE;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,07;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S024	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	6,5	68	UK – regularna, kier od W; KN - x; P - 5% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,81;
S025	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	19	12	148	UK – nieregularna, szeroka; KN - x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane wierzchołek, konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - szczelina; U - duży po odłamanym konarze; OP - średnio; I - 20% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,86;
S026	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	16	11	132	UK – nieregularna, szeroka; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane wierzchołek, konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 20% na W;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,67;
S027	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	18	21	170; 146; 113; 99	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlony u podstawy; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - szczelina; U - duży po odłamanym konarze; OP - średnio; I - 80% na S;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,62;
S028	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	15	14	83; 70; 55; 66	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlony u podstawy; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 80% na S;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,86;
S029	Topola chińska	<i>Populus simonii</i>	16	10,5	156	UK – nieregularna; KN - x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 30% na SW;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,90;
S030	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	12	11,5	106	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlony na 1,5 m; P - 50% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - szczelina; U - x; OP - średnio; I - 30% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,49;
S031	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	7,5	75	UK – nieregularna; KN - x; P - 15% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,99;
S032	Wierzba szara	<i>Salix cinerea</i>	4,5	8x10	80 m ²	UK – regularna; KN - x; P - 15%; N - x; C - x; IN - wymaga odmlodzenia;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - 2,10;
S033	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	6	45; 27	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie u podstawy; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na S;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypany; OK - średnio; R - od kosiarki; U - x;	G – x; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,17;
S034	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	13,5	11	104	UK – nieregularna; KN - rozwidlony na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypany; OK - średnio; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,13;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 - Stagnacja	MSA - miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 - Rezygnacja	
S035	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	9	4,5	54	UK – regularna, kier od W; KN – rozwidlenie na 5 m; P - 15% drobny; N - x; C - x; IN - złamany wierzchołek;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - wet wood; U - x; OP - średnio; I - 5% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,20;
S036	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	19	15	147; 266	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie na 1,2 m; P - 30% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - polamane wierzchołek, konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - duży po odłamanym konarze; OP - średnio; I - 20% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 3,26;
S037	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	13	10,5	157	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 25% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - konary;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - żebra; U - duży po odłamanym konarze; OP - średnio; I - 20% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 3,13;
S038	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	6	6	29; 38	UK – nieregularna, zagłuszona; KN - rozwidlenie; P - 25% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – <i>Fomes pomaceus</i> ; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,28;
S039	Wierzba płacząca odm. żółtokora	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	15	14	136	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 3 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny, wygięty; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - 20% na SW;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,32;
S040	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	6,5	34; 63	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 1,1 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - średnia; MSA - 3,09;
S041	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	11	7,5	61	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie na 1,7 m; P - 25% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięte; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 3,21;
S042	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	8	53; 45	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 1,2 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - średnia; MSA - 3,28;
S043	Wierzba płacząca odm. żółtokora	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	15	12,5	174	UK – nieregularna, kier SE; KN - rozwidlenie na 1,4 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny, wygięty; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 1; OS - średnia; MSA - 2,77;
S044	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	7	65	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,21;
S045	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	43	UK – regularna, etiolizacja; KN - x; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 20% na E;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,13;
S046	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>	2	2	4 m ²	UK – regularna kier na S; KN - x; P - 15% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,15;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S047	Snieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	2	4	12,5 m ²	UK – regularna; KN - x; P - 15%; N - x; C - x; IN - wymaga odmlodzenia;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - 3,00;
S048	Wierzba zwisająca	<i>Salix xpendulina</i>	3,5	3	7 m ²	UK – nieregularna, odroślowa; KN - x; P - 10% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 1; OS - średnia; MSA - 2,70;
S049	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	9	6	79	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,75;
S050	Wierzba zwisająca	<i>Salix xpendulina</i>	14	15	180	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 1,8 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny, wygięty; R - x; C - x; D - konar - pęknięcie naprężeniowe; U - x; OP - x; I - 10% na SW;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,30;
S051	Wierzba zwisająca	<i>Salix xpendulina</i>	9	11	104	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 1,8 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny, wygięty; R - x; C - x; D - uszkodzony konar; U - x; OP - x; I - 100% na SE;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,18;
S052	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	8	3	35	UK – regularna; KN - x; P - 5% drobny; N - x; C - x; IN - u podnóża zamierający cyprysik, mahonia, bukszpan;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,65;
S053	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	8	3	28	UK – regularna; KN - x; P - 5% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,70;
S054	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	63	UK – regularna; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,61;
S055	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	3,5	1,5	8; 6	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 1 m; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - odziomek;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 0; OS - średnia; MSA - 3,00;
S056	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	9,5	7,5	76	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - samosiew bzu;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - wypróchnienie; OP - mało; I - 20% na E;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - bardzo dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 0; OS - średnia; MSA - 3,43;
S057	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	9	6,5	74	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - wypróchnienie; OP - mało; I - 20% na E;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Trypodendron sp.</i> mrówki; B - x;	FW2	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,84;
S058	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	9,5	6,5	72	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – x; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,11;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S059	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	8	72	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – x SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,22;
S060	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	7,5	87	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,22;
S061	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	8	81	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 3 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – x SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,44;
S062	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	7	64	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - od kosiarki; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,61;
S063	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	11,5	6,5	64; 66	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 0,8 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne, po konarach; C - x; D - x; U - x; OP - dużo; I - 10% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,70;
S064	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	9	5	61	UK – nieregularna; KN - x; P - 5% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 1; OS - średnia; MSA - 3,94;
S065	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	9	102	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 3,5 m na 6 konarów; P - 20% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,23;
S066	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14,5	10	119	UK – nieregularna, kier SW; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - buły poprzeczne; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – <i>Phytophthora sp</i> ; SZ - x B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 4,40;
S067	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	15	11	70; 100	UK – regularna, szeroka; KN - rozwidlenie na 1,2 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne, po konarach; C - x; D - żebro, buły; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,90;
S068	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	12,5	10	95	UK – nieregularna, kier S; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,63;
S069	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	13	7,5	87	UK – nieregularna, kier S; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – x, przybyszowe; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,72;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S070	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	13	5,5	101	UK – nieregularna; KN - x; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - otwarte wypróchnienie; OP - mało; I - 15% na E;	KP - x; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> ; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 4,07;
S071	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	12	8,5	88	UK – nieregularna, kier S; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 35% na E;	KP - x NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> ; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,71;
S072	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	7	71	UK – nieregularna, kier S; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N - liści; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> , mrówki; B - x;	FW2	K - 3; OS - średnia; MSA - 5,01;
S073	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	11	5	59	UK – nieregularna, kier S; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 25% na E;	KP - x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 5,21;
S074	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	11	143	UK – nieregularna, kier SW; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP - x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 4,64;
S075	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13,5	6	88	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - odcięty konar; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP - x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 4,16;
S076	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13,5	5,5	78	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP - x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 4,31;
S077	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13,5	9	106	UK – nieregularna, kier S; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi, boa, przybyszowe; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 4,45;
S078	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14,5	10	119	UK – nieregularna, kier SE; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczeliny zabliźnione; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP - x; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 5,48;
S079	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	5	50	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 25% na E;	KP - x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW2	K - 2; OS - średnia; MSA - 5,68;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S080	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	8,5	6	95	UK – nieregularna, częściowo zagłuszona, kier N; KN - rozwidlenie V na 2 m; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - ślady po nożu; D - x; U - otwarte wypróchnienie; OP - mało; I - 25% na SE;	KP – x; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,41;
S081	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	12	3,5	51	UK – nieregularna, luźna; KN - x; P - 5% średni, drobny; N - x; C - odcięty konar; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na N;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,69;
S082	Snieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,3	1	4 m ²	UK – regularna; KN - x; P - 5%; N - x; C - x; IN - wymaga odmlodzenia;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - 3,55;
S083	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	6	61	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,81;
S084	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	6	72	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 5% średni, drobny; N - x; C - odcięty konar; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,73;
S085	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	7	8	109	UK – regularna; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - zawieszony kabel; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Cameraria ohridella</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,89;
S086	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6,5	5,5	70	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - zgoźel pnia 1,6 do 2,2 m; OP - mało; I - 10% na SE;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G – <i>Fomes pomaceus</i> ; SZ - mrówki; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,97;
S087	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	5	35; 39; 41	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 1,2 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina, żebro; U - na konarach, otarcie; OP - mało; I - 10% na SE;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,82;
S088	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	4,5	44	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 5% na SE;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 6,10;
S089	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6,5	5	61	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 5% na E;	KP – x; NA - trawnik, droga ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 6,20;
S090	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	6,5	64	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,64;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 - Stagnacja	MSA - miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 - Rezygnacja	
S091	Snieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,3	1	4,5 m ²	UK – regularna; KN - x; P - 5%; N - x; C - x; IN - wymaga odmlodzenia;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG -x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - 4,81;
S092	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	10	8	84	UK – nieregularna; KN - x; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi, boa, przybyszowe; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 5,46;
S093	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	9	43	50	UK – nieregularna, kier SW; KN - rozwidlenie V na 2 m; P - 5% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - ślady po nożu; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,33;
S094	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	10,5	4	51	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie V na 2 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,32;
S095	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	12,5	7	89	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie V na 2 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - wypróchnienie; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,34;
S096	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	7	68	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,84;
S097	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9,5	8	92	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,63;
S098	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13,5	6	109	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 1,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - odcięty konar; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe, malowanie; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,45;
S099	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	4	55	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,50;
S100	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	11	5	73	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,03;
S101	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	4,5	62	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 3,5 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,10;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S102	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	12	7	84	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 25% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 4,22;
S103	Leszczyna turecka	<i>Corylus colurna</i>	14	10,5	119	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na SW;	KP - x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 3,67;
S104	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12,5	7,5	80	UK – nieregularna, luźna, etiolizacja; KN - x; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, krzywy; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP - x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Chalara fraxini</i> ; SZ - złe; <i>Leperisinus fraxini</i> ; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 3,71;
S105	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	13,5	10	143	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 25% na E;	KP – nabiegi, boa, przybyszowe; NA - trawnik, ziemia, ścieżka; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,67;
S106	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	21	7	80	UK – regularna, etiolizacja; KN - x; P - 10% średni i drobny; N - x; C - x; IN - podniesiona do 8 m;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 1,99;
S107	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21,5	7	71	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - zabliźniona szczelina; U - x; OP - mało; I - 5% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,03;
S108	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	11	112	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - osle ucho w rozwidleniu; U - x; OP - mało; I - 10% na E;	KP – boa; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,52;
S109	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22,5	9	110	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - zabliźniona szczelina w rozwidleniu; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – boa; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,80;
S110	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30	13	163	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K - 2; OS - niska; MSA - 3,44;
S111	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30,5	13	137	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K - 2; OS - niska; MSA - 3,35;
S112	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	31	13	143	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - wet wood; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K - 2; OS - niska; MSA - 3,25;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S113	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30,5	16	153	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,89;
S114	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30	17	159	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,89;
S115	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30	17,5	148	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,45;
S116	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	28,5	16,5	103	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,45;
S117	Głóg szypulkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	5,5	3,5	25	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 1,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - zle; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,98;
S118	Głóg szypulkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	4,5	3,5	18	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 1,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - zle; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,98;
S119	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30,5	17,5	163	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,45;
S120	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	30	17	182	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,22;
S121	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	31	16	175	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 2,11;
S122	Głóg szypulkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	18	2,5	5	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie 1,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - zle; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,98;
S123	Głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus laevigata</i>	4	4	25	UK – regularna; KN - rozwidlenie 1,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - zle; D - x; U - x; OP - mało; I - 30% na S;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,82;
S124	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	28	15	117	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- zle; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - zle; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,80;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S125	Głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	3,5	3,5	18	UK – nieregularna; KN – rozwidlenie 1,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,90;
S126	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	34	18	196	UK – nieregularna kier S; KN - x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na NE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypały; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,67;
S127	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	33	19	176	UK – nieregularna kier S; KN - x; P - 30% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypały; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,49;
S128	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	6	5	12	UK – nieregularna, odroślowa; KN - x; P - 10% drobny; N - x; C - złe; IN - odrosty pniowe;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - x; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Cameraria ohridella</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 3,62;
S129	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	13	10,5	103	UK – regularna; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Cameraria ohridella</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,14;
S130	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	14,5	7	69	UK – regularna, kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - pod okapem topoli;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 20% na NE;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,21;
S131	Dąb szypułkowy odm. piramidalna	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	14	7	85	UK – regularna; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,07;
S132	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	11	6,5	52	UK – regularna; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - buły; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Cameraria ohridella</i> ; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,58;
S133	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	23,5	9	129	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - szczelina, wet wood; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypały; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,00;
S134	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	15	3,5	64	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 40% drobny, średni, gruby; N - liści; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypały; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 4,38;
S135	Dąb szypułkowy odm. Piramidalna	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	13,5	8,5	90	UK – regularna; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypały; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,51;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S136	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	21	10,5	113	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 4,35;
S137	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	16	14	140	UK – regularna, etiolizacja, luźna; KN - rozwidlenie; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 5% na E;	KP – nabiegi, mało, przybyszowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Cynips quercus-folii</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,48;
S138	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	22,5	7,5	86	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - szczelina, wet wood; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	
S139	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	24,5	12,5	138	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - liści; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,14;
S140	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	22	11	148	UK – nieregularna; KN - x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 4,55;
S141	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	23	10	102	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - żebro; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,60;
S142	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	26	9	86	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - rozwidlenie V na 0,4 m; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - żebro; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,51;
S143	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	8,5	86	UK – nieregularna, szeroka; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypaany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,74;
S144	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	26,5	10	100	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - szczelina od 5 m w dół; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,65;
S145	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	26	11	122	UK – nieregularna kier S; KN - x; P - 35% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 40% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypaane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 5,99;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;			
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;			
S146	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	26	9	86	UK – nieregularna, etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,81;
S147	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25	8	78	UK – regularna, szeroka; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - pod okapem topoli;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,69;
S148	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28	12,5	138	UK – nieregularna; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na SW;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,96;
S149	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	24	13,5	185	UK – nieregularna kier S; KN - x; P - 20% drobny, średni; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 6,01;
S150	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28	12,5	138	UK – nieregularna; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na NE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,88;
S151	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28	13	172	UK – nieregularna; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypa; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,90;
S152	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28,5	14,5	169	UK – nieregularna; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 6,04;
S153	Klon jawor odm. purpurowa	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	12,5	12	118	UK – regularna, szeroka; KN - x; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - pod okapem topoli;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypa; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,74;
S154	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	27,5	12,5	129	UK – nieregularna; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,71;
S155	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28	11,5	157	UK – nieregularna; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 5,86;
S156	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	28,5	13	192	UK – nieregularna; KN - x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 6,02;
S157	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	4,5	4	16	UK – nieregularna, odroślowa; KN - x; P - 10% drobny; N - x; C - złe; IN - odrosty;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - x; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - dużo; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - dobra; MSA - 6,02;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S158	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	12	9	89	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie na 2,5 m; P 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - wet wood po odciętych konarze n 2 m; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,74;
S159	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15,5	13	131	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na E;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,74;
S160	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	13,5	136	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 5,52;
S161	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13	12,5	119	UK – nieregularna, szeroka; KN – rozwidlenie V na 3 m; P 10% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - zabliźniona szczelina od 0,5 do 2 m; U - x; OP - mało; I - 10% na E;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,79;
S162	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	26	10	174	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D -x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,42;
S163	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	13	12	79	UK – nieregularna; KN - x; P 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 3,19;
S164	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	26	13,5	162	UK – nieregularna; KN - x; P 20% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 3,17;
S165	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	23	15,5	168	UK – regularna, etiolizacja, luźna; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 20% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D -x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – nabiegi, mało, przybyszowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,55;
S166	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	28	14,5	179	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,64;
S167	Topola maximowicza klon żeński	<i>Populus maximowiczii</i>	28,5	15	160	UK – nieregularna kier S; KN x; P - 30% drobny, średni; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – x; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na N;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyane; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ -x; B - <i>Dothisa populnea</i> ;	FW1	K – 2; OS - niska; MSA - 1,64;
S168	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	22	14,5	155	UK – regularna, etiolizacja, luźna; KN - x; P - 20% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D -x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – nabiegi, mało, przybyszowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,10;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;			
S169	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra</i> 'Italica' - bastard	22	6	67	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - kładzie się na dąb;	KSZ – regularny; R - drobne, rany; C - złe; D - x; U - wypróchnienie u podstawy; OP - średnio; I - 50% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - bardzo niska; MSA - 2,79;
S170	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	21	13	119	UK – regularna, etiolizacja, luźna; KN - rozwidlenie na 7 m; P - 25% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 5% na SE;	KP – nabiegi, mało, przybyszowe; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,13;
S171	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra</i> 'Italica' - bastard	28	8	113	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - podstawa na 14 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,76;
S172	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	21	9,5	86	UK – regularna, etiolizacja, kier W; KN - rozwidlenie na 7 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 20% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,69;
S173	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra</i> 'Italica' - bastard	26	5	72	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - podstawa na 14 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,57;
S174	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>	2	3	40 m ²	UK – regularny, lukowaty; KN - x; P - 15%; N - x; C - złe, słabe formowanie; IN - wymaga odmłodzenia, usunąć siewki;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - 4,20;
S175	Głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicellata</i>	7	4	55	UK – regularna; KN - rozwidlenie 1,5 m; P - 30% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,88;
S176	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14	11	106	UK – nieregularna, etiolizacja kier SW; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 10% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na NE;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,20;
S177	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	13	115	UK – nieregularna, etiolizacja kier SE; KN - rozwidlenie V na 2,5 m na 5 konarów; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - szczelina zablizniona od podstawy do 2 m; U - x; OP - mało; I - 25% na E;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 4,02;
S178	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra</i> 'Italica' - bastard	26	13	136	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 20% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - podstawa na 8 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,49;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S179	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13,5	10,5	91	UK – nieregularna kier S; KN – rozwidlenie V na 2,5 m; P – 10% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – drobne, po gałęziach ; C - x; D -szczelina zablizniona; U - x; OP - mało; I - 25% na SE;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,72;
S180	Głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	8	7	35; 36; 53	UK – regularna; KN - rozwidlenie 1,2 m; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,99;
S181	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra 'Italica' - bastard</i>	26	11	121	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - podstawa na 13 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - wet wood na 5 m; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,13;
S182	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	6,5	68	UK – regularna, etiolizacja, kier W; KN – rozwidlenie na 5 m; P - 5% drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 20% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,75;
S183	Topola czarna odm. włoska - mieszaniec	<i>Populus nigra 'Italica' - bastard</i>	28	9	98	UK – nieregularna, silna etiolizacja; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - podstawa na 15 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - wet wood na 3 m; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,76;
S184	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	24,5	12,5	117	UK – regularna, etiolizacja; KN – rozwidlenie na 5 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - resztki żywopłotu;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 35% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,80;
S185	Lipa krymska	<i>Tilia 'Euchlora'</i>	16	12	99	UK – regularna kier E; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - szczepiona;	KSZ – regularny; R - drobne, po konarach ; C - x; D - żebrobyły; U - dziupla; OP - mało; I - 20% na E;	KP – nabiegi, boa, mało; NA - trawnik; ZPG - x; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,15;
S186	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14	10,5	93	UK – regularna kier NS; KN – rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - wgłębny, zablizniony; OP - mało; I - 35% na E;	KP – przybyszowe; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,47;
S187	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	15,5	14	131	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 3 m; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - resztki żywopłotu;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - szczelina zablizniona; U - wypróchnienie u podstawy; OP - mało; I - 25% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,36;
S188	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13	8,5	69	UK – regularna, etiolizacja, kier W; KN - x; P - 15% średni, drobny; N -x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne, po gałęziach ; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 20% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,59;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S189	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	15	12,5	126	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 3 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - drobne, po gałęziach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 20% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, ścieżka ziemna; ZPG - przysypyany; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,70;
S190	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	24	13,5	134	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 3 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne, C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 15% na SE;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,65;
S191	żywoplot cięty: Snieguliczka biała, porzeczką alpejską, klon pospolity	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ribes alpinum</i> , <i>Acer platanoides</i>	0,8	0,8	15mb	UK – regularny, lukowaty, podniesiony; KN - x; P - 5%; N - x; C - złe, słabe formowanie; IN - wymaga odmlodzenia;	KSZ – x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP – x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 0; OS - x; MSA - ;
S192	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	17	12	111	UK – nieregularna, etiolizacja, kier W; KN - rozwidlenie na 8 m; P - 30% średni i drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na W;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x; Leperisinus fraxini; B - x;	FW2	K – 4; OS - średnia; MSA - 2,19;
S193	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	13	131	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona kier W; KN - rozwidlenie V na 2,5 m; P - 15 % średni i drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - ośle ucho; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,20;
S194	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i>	9	11	50	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% drobny; N - x; C - x; IN - zniszczony wierzchołek;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,20;
S195	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	23	13	138	UK – nieregularna, etiolizacja, kier W; KN - x; P - 25% średni i drobny; N - x; C - x; IN - samosiew robinii;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na W;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 4; OS - średnia; MSA - 2,26;
S196	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13,5	14	74; 81	UK – nieregularna, zagłuszona, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 0,2 m; P - 30% średni i drobny; N - x; C - x; IN - samosiew klonowy;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,25;
S197	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	24,5	13,5	142	UK – regularna kier E; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne, po konarach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik; ZPG - x; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,06;
S198	Lipa krymska	<i>Tilia 'Euchlora'</i>	23	12,5	153	UK – regularna kier E; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni, drobny; N - x; C - x; IN - szczepiona;	KSZ – regularny; R - drobne, po konarach; C - x; D - x; U - x; OP - mało; I - 15% na E;	KP – nabiegi, boja, mało; NA - trawnik; ZPG - x; OK - mało; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,31;
S199	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	6,5	4	22	UK – regularna; KN - rozwidlenie; P - drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,00;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;			
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
S200	Wiśnia domowa	<i>Prunus cerasus</i>	6,5	4	32; 37	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 0,8 m; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na W;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,74;
S201	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	4,5	4	25	UK – regularna; KN - rozwidlenie; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - zniszczony wierzchołek;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,38;
S202	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	4,5	4	26 m ²	UK – regularna; KN - rozwidlenie; P - drobny; N - x; C- x; IN - podrost klonowy;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,00;
S203	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	3,5	2	20	UK – regularna; KN - x; P - 5% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na W;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,90;
S204	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	7	5	33	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 1,5 m; P - 5% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na W;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW0	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,40;
S205	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	10	11,5	79; 67; 52; 67	UK – regularna; KN - rozwidlenie; P - drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – <i>Fomes pomaceus</i> ; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,42;
S206	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	6	5,5	33	UK – regularna; KN - rozwidlenie; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,42;
S207	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	6,5	6	40; 35	UK – regularna; KN - rozwidlenie u podstawy; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,42;
S208	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	4	3	14 m ²	UK – regularna, krzewiasta; KN - rozwidlenie u podstawy; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – x; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,60;
S209	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	22	14,5	149	UK – nieregularna, etiolizacja, kier W; KN - x; P - 25% średni i drobny; N - x; C- x; IN - samosiew robinii;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina; U - wypróchnienie; OP - średnio; I - 15% na W;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - x; U - x;	G – mączniak; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,55;
S210	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	6	6	25; 32; 39; 16; 14; 34	UK – regularna; KN - rozwidlenie u podstawy; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,09;
S211	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i>	2	3	28,5 m ²	UK – regularna; KN - x; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - samosiew bzu;	KSZ – x; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,20;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S212	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9,5	7	18	UK – regularna; KN - x; P - drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 3,20;
S213	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	7	6,5	23	UK – regularna; KN - x; P - drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 3,20;
S214	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	11,5	9	45	UK – regularna; KN - x; P - drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – regularny; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 3,20;
S215	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	9,5	10,5	42; 24	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 1,2 m; P - drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,70;
S216	Wiśnia domowa	<i>Prunus cerasus</i>	9	7	38; 33	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 0,2 m; P - 15% drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - 10% na W;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,50;
S217	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	8,5	10	12 do 25	UK – regularna, odroślowa; KN - x; P - 5% drobny; N - x; C - x; IN - 28 pni;	KSZ – regularny; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP - x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - x; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW0	K - 2; OS - średnia; MSA - 2,80;
S218	Porzeczka alpejska	<i>Ribes alpinum</i>	1,5	3	13,5 m ²	UK – regularny; KN - x; P - 10%; N - x; C - x; IN - usunąć samosiewy bzu i klonu;	KSZ - x; R - x; C - x; D - x; U - x; OP - x; I - x	KP - x; NA - x; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 0; OS - x; MSA - 2,60;
S219	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	35,5	14,5	266	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 10 m, kier WE; P - 40% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na SE;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - x; B - x;	FW2	K - 2; OS - niska; MSA - 1,14;
S220	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	36	15	356	UK – nieregularna, kier NS; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C - złe; IN - połamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - x; B - x;	FW2	K - 2; OS - średnia; MSA - 1,43;
S221	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	23	10	112	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 5 m; P - 20% średni, drobny; N - x; C - x; IN - podniesiona do 7 m;	KSZ – regularny; R - drobne; C - x; D - 2 żebra; U - x; OP - mało; I - x;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, asfalt; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,55;
S222	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	12,5	135	UK – regularna, etiolizacja, kier S; KN - rozwidlenie na 4 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW2	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,60;
S223	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	18,5	11,5	114	UK – regularna, etiolizacja; KN - x; P - 10% średni i drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - dziuple; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,78;
S224	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	12	81	UK – regularna, etiolizacja, kier S; KN - rozwidlenie na 4 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C - x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - dziuple; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G - x; SZ - x; B - x;	FW1	K - 3; OS - średnia; MSA - 3,24;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S225	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	8	86	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona; KN – rozwidlenie V na 2,5 m; P – 30% średni i drobny; N - x; C- x; IN - wrasta w topolę;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - rozległa rana od 8 m do podstawy (po piorunie); C - złe; D - pęka; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - <i>Trypodendron sp</i> ; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,05;
S226	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	37	26	279	UK – nieregularna; KN - x; P 30% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na S;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,91;
S227	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	10	95	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona; KN – rozwidlenie V na 2,5 m; P – 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - wrasta w topolę;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina zabliźniona od podstawy do 1 m; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 1,31;
S228	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	37,5	27	351	UK – nieregularna; KN - rozwidlenie na 1,8 m; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na S;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - niska; MSA - 2,05;
S229	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	36,5	18,5	286	UK – nieregularna; KN - x; P 30% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na S;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,67;
S230	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	37	31	317	UK – nieregularna; KN - x; P 30% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 25% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,18;
S231	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	37	25	283	UK – nieregularna; KN - x; P 30% drobny, średni, gruby; N x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,00;
S232	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	37	30	279	UK – nieregularna, kier NS; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – <i>Ganoderma sp</i> ; SZ - <i>Viscum album</i> , ślady dzięciola; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 1,01;
S233	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	12	141	UK – regularna, etiolizacja, kier S; KN – rozwidlenie na 2,5 m na 6 konarów; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - pęknięty pień; U - dziuple; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi, boa, przybyszowe, mało; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – <i>Phytophthora sp</i> ; SZ - x B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,53;
S234	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	7	154	UK – regularna, etiolizacja, kier S; KN – rozwidlenie na 2,5 m na 6 konarów; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - pęknięty pień; U - kalus powierzchniowy od W od 1,5 do podstawy; OP - średnio; I - 40% na E;	KP – nabiegi, mało; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,19;

Seksja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 - Stagnacja	MSA - miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochylenie;	R – rany; U – ubytki;		FW3 - Rezygnacja	
S235	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	9	101	UK – regularna, etiolizacja, kier W; KN – rozwidlenie na 2,5 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - dziuple; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,01;
S236	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	10	71	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona kier SE; KN - rozwidlenie na 4 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na SE;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,65;
S237	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	10,5	76	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - wrasta w topolę;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina zablizniona od podstawy do 1 m; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 1,92;
S238	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	13,5	112	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - wrasta w topolę;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - ośle ucho; U - x; OP - średnio; I - 10% na SE;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 1,66;
S239	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	23	11	153	UK – regularna; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 10% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – regularny; R - x; C - złe; D - x; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, asfalt; ZPG - wysadza krawężnik; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,38;
S240	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21	7	105	UK – regularna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - dziuple; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,86;
S241	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	8,5	70	UK – regularna, etiolizacja, kier W; KN - x; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - strangulacja sznurkiem na 1,7 m; U - dziuple; OP - średnio; I - 20% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,98;
S242	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19,5	12,5	113	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona kier S; KN - x; P - 25% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - ośle ucho; U - x; OP - średnio; I - 15% na SE;	KP – nabiegi, boa; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 4; OS - średnia; MSA - 2,70;
S243	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	10	62	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona kier SE; KN - rozwidlenie na 4 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na SE;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 1,77;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S244	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	23	28,5	146; 158; 155	UK – nieregularna kier SE; KN – rozwidlenie u podstawy; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe, odcięty konar; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - szczelina piorunowa od 8 do 3 m, żebro równoległe; U - x; OP - średnio; I - 50% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - niska; MSA - 1,83;
S245	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	5,5	5	44	UK – regularna, silna etiolizacja, zagłuszona; KN - rozwidlenie na 1,6 m; P - 30% średni i drobny; N - x; C- x; IN - połamane gałęzie;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 0,99;
S246	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	8,5	95	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,88;
S247	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21	11	136	UK – regularna, etiolizacja; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- odcięty duży konar - płasko; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina i żebro od E; U - zachyna próchnięć; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – <i>Phytophthora sp</i> ; SZ - x B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,44;
S248	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	9	93	UK – regularna, etiolizacja, zagłuszona kier SE; KN - rozwidlenie V na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - ośle ucho; U - x; OP - średnio; I - 15% na SE;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,34;
S249	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	35,5	18,5	204	UK – nieregularna kier SE; KN - x; P - 25% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - połamane konary;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - drobne; C - złe; D - szczelina piorunowa od 8 do 3 m, żebro równoległe; U - x; OP - średnio; I - 40% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - niska; MSA - 1,72;
S250	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	18	8,5	94	UK – regularna; KN - rozwidlenie ; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - zachyna próchnięć; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, asfalt; ZPG - wysadza krawężnik; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,16;
S251	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16,5	9,5	128	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - oderwany konar;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na SW;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany podnosi ziemię; OK - x; R - drobne; U - x;	G – infekcja grzybowa; SZ - x; B - x;	FW3	K – 3; OS - niska; MSA - 2,72;
S252	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22,5	10	117	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - ośle ucho, szczelina; U - x; OP - średnio; I - 10% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,52;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S253	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	11	120	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN – rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - odcięty konar;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 50% na S;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany podnosi ziemię; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - niska; MSA - 2,01;
S254	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	38,5	27	455	UK – nieregularna; KN - x; P - 30% drobny, średni, gruby; N - x; C- złe; IN - polamane konary;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 10% na SW;	KP – nabiegi korzeniowe; NA - trawnik; ZPG - x; OK - x; R - x; U - x;	G – x; SZ - <i>Viscum album</i> ; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 2,43;
S255	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17,5	11	120	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - żebro od S, ostre żebro; U - wypróchniały konar; OP - średnio; I - 50% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany podnosi ziemię; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - niska; MSA - 2,59;
S256	Lipa krymska	<i>Tilia</i> 'Euchlora'	19	9,5	177	UK – regularna; KN - rozwidlenie 3m na 6 konarów; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - narośla na pniu; U - x; OP - mało; I - x;	KP – x; NA - trawnik, ziemia, asfalt; ZPG - wysadza krawężnik; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,25;
S257	Lipa krymska	<i>Tilia</i> 'Euchlora'	19,5	9	114	UK – regularna; KN - rozwidlenie 2,5 m na 4 konary; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - narośla na pniu; U - x; OP - mało; I - x;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia, asfalt; ZPG - wysadza krawężnik; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,25;
S258	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19,5	9	119	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - buły; U - x; OP - średnio; I - 20% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - niska; MSA - 2,88;
S259	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	11	119	UK – regularna, etiolizacja kier E; KN - rozwidlenie na 2 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - szczelina; U - x; OP - średnio; I - 25% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - niska; MSA - 2,49;
S260	Lipa krymska	<i>Tilia</i> 'Euchlora'	14	11	110	UK – regularna; KN - x; P - 15% drobny; N - x; C- x; IN - odcięty konar;	KSZ – regularny; R - drobne; C - złe; D - narośla na pniu; U - x; OP - mało; I - 10% od N;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia, asfalt; ZPG - wysadza krawężnik; OK - dużo; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 2; OS - średnia; MSA - 3,16;
S261	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23,5	7	113	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 20% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - 5% na E;	KP – nabiegi; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW1	K – 3; OS - średnia; MSA - 3,16;
S262	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20,5	9,5	105	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN - rozwidlenie na 2,5 m; P - 15% średni i drobny; N - x; C- x; IN - x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R - ślady po konarach; C - złe; D - x; U - x; OP - średnio; I - x;	KP – nabiegi, boa; NA - trawnik, ziemia; ZPG - przysypyany; OK - x; R - drobne; U - x;	G – x; SZ - x; B - x;	FW2	K – 3; OS - średnia; MSA - 2,81;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy witalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S263	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	6	100	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN – rozwidlenie na 2,5 m; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 5% na E;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,00;
S264	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21	14	127	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN – rozwidlenie na 2 m; P – 15% średni i drobny; N – x; C – x; IN – oderwany konar;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – x;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany podnosi ziemię; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW2	K – 3; OS – średnia; MSA – 2,87;
S265	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	13,5	131	UK – regularna, etiolizacja; KN – rozwidlenie V na 2 m; P – 15% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – ośle ucho, szczelina zabiżniona; U – x; OP – średnio; I – x;	KP – nabiegi, boa; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 2,86;
S266	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21	11	106	UK – regularna, etiolizacja, kier N; KN – x; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – szczelina; U – x; OP – średnio; I – x;	KP – boa; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW2	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,54;
S267	Głóg odgiętotdziakowy	<i>Crataegus rhipidophylla</i>	17	15,5	45; 53; 68; 32; 109	UK – regularna, silna etiolizacja, zagłuszony; KN – rozwidlenie na 0,3 m; P – 25% średni i drobny; N – x; C – x; IN – jeden konar suchy;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 10% na E;	KP – x; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW2	K – 3; OS – średnia; MSA – 2,73;
S268	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	39,5	26	427	UK – nieregularna; KN – x; P – 30% drobny, średni, gruby; N – x; C – złe; IN – polamane konary;	KSZ – regularny; R – drobne; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 10% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA – trawnik; ZPG – x; OK – x; R – x; U – x;	G – x; SZ – x; B – x; Viscum album; B – x;	FW2	K – 2; OS – średnia; MSA – 2,48;
S269	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	32	21	246	UK – nieregularna; KN – x; P – 30% drobny, średni, gruby; N – x; C – złe; IN – polamane konary, kolizja z linią energetyczną;	KSZ – regularny; R – drobne; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 15% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA – trawnik; ZPG – x; OK – x; R – x; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW2	K – 2; OS – średnia; MSA – 3,98;
S270	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	11,5	104	UK – regularna, etiolizacja kier S; KN – rozwidlenie na 2 m; P – 10% średni i drobny; N – x; C – x; IN – kolizja z linią energetyczną;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe, malowanie; D – szczelina od W, wet wood; U – x; OP – średnio; I – 15% na SE;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,71;
S271	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	10,5	115	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN – rozwidlenie na 2 m; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – szczelina od W, wet wood; U – x; OP – średnio; I – 5% na E;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,39;

Sekcja S

Nr	Nazwa		Wymiary			Stan drzewa			Choroby i szkodniki	Fazy vitalności wg Roloffa	Ocena
	polska	łacińska	wysokość (m)	średnica korony (m)	obwód pnia (cm)	Korona	Pień	System korzeniowy			
						UK – układ;	KSZ – kształt;	KP – korz powierzchniowe;			
						KN – konstrukcja;	R – rany; C – cięcie;	NA – nawierzchnia;			
						PS – posusz;	D – defekty; U – ubytki;	ZPG – zmiana poz. gruntu;			
						N – nekrozy liści;	OP – odrosty pniowe;	OK – odrosty korzeniowe;	B – bakterie;	FW2 – Stagnacja	MSA – miąższość strefy aeracyjnej;
						C – cięcie; IN – inne;	I – pochYLENIE;	R – rany; U – ubytki;		FW3 – Rezygnacja	
S272	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19,5	6	92	UK – regularna, etiolizacja kier W; KN – rozwidlenie na 2,5 m; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 5% na E;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,04;
S273	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	17	155	UK – regularna, etiolizacja, kier S; KN – rozwidlenie U na 3 m; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – x;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 3,13;
S274	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13,5	9	149	UK – regularna, silna etiolizacja; KN – rozwidlenie U na 2 m; P – 15% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 15% na E;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 2,57;
S275	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	11,5	136	UK – regularna, etiolizacja; KN – rozwidlenie V na 3 m; P – 15% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – ośle ucho, szczelina zabilżniona; U – x; OP – średnio; I – 10% na SE;	KP – nabiegi; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 2; OS – średnia; MSA – 2,83;
S276	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	15	146	UK – regularna, silna etiolizacja; KN – rozwidlenie na 2 m; P – 20% średni i drobny; N – x; C – x; IN – x;	KSZ – nieregularny, wygięty; R – ślady po konarach; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 10% na E;	KP – nabiegi, boa; NA – trawnik, ziemia; ZPG – przysypyany; OK – x; R – drobne; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW1	K – 3; OS – średnia; MSA – 2,56;
S277	Topola kanadyjska odm. bujna	<i>Populus xcanadensis</i> 'Robusta'	34,5	22	383	UK – nieregularna; KN – x; P – 30% drobny, średni, gruby; N – x; C – złe; IN – polamane konary;	KSZ – regularny; R – drobne; C – złe; D – x; U – x; OP – średnio; I – 20% na E;	KP – nabiegi korzeniowe; NA – trawnik; ZPG – x; OK – x; R – x; U – x;	G – x; SZ – x; B – x;	FW2	K – 0; OS – średnia; MSA – 1,20;